

FINÁLNÍ INFORMACE

Symposium 75 let ortopedie v ÚVN Praha

pořádají

Klinika ortopedie 1. LF UK a ÚVN Praha

Záštitu

plk. gšt. MUDr. Luděk Hána, MBA
ředitel ÚVN Praha



Pátek 18. září 2026
Aula ÚVN Praha

Symposium je pořádáno podle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a je hodnoceno 6 kredity

Organizační zajištění: ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o.
www.ortopedicke-centrum.cz

GENERÁLNÍ PARTNER



HLAVNÍ PARTNEŘI



ZIMMER BIOMET
Your progress. Our promise.™

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE



VÝZNAMNÍ PARTNEŘI

ORTHOSPACE



PARTNEŘI



fidia

enovis™





Vážené kolegyně a kolegové,

v letošním roce oslaví ortopedie v ÚVN Praha 75 let (1951) od vzniku lůžkového oddělení a současně dovrší 15 roků od transformace na klinické pracoviště (2012). Při této příležitosti bychom Vás rádi pozvali na slavnostní přednáškové symposium věnované tomuto výročí. Aktivní účast přislíbili významní odborníci z předních ortopedických a traumatologických pracovišť České republiky. Věřím, že tato akce nás obohatí nejen po odborné stránce, ale bude i příležitostí k řadě osobních setkání.

Těším se na Vaši účast

Odborný garant symposia

prof. MUDr. Michal Tuček, Ph.D.

Přednosta Kliniky ortopedie 1. LF UK a ÚVN Praha

FINÁLNÍ PROGRAM AKCE

8:00 - 8:30 Registrace

8:30 - 9:00 Slavnostní zahájení - historie pracoviště

BLOK I 9:00 - 11:00

Inovace operační léčby malých kloubů ramenního pletence

Tuček M.

Klinika ortopedie 1. LF UK a ÚVN Praha

Spolupráce anatomů s ortopedy a traumatology: od počátků k dnešku

Naňka O.

Anatomický ústav 1. LF UK Praha

Přínos a úskalí chirurgické luxace kyčelního kloubu s redirekcí epifyzy při léčení coxa vara dospívajících

Šponer P.

Ortopedická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové

Prodlužování dlouhých kostí u dětí

Ošťádal M.

Ortopedická klinika FNB, 1. LF UK a IPVZ

Náhrady lopatky

Tomáš T.

I. ortopedická klinika Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Léčba zlomenin proximálního humeru ve vyšším věku - náš současný koncept

Kloub M.

Oddělení úrazové chirurgie Nemocnice České Budějovice

Náhrady ramenního kloubu

Fulín P.

I. ortopedická klinika 1. LF UK a FNMH

Náhrady hlavice radia

Douša P.

Klinika úrazové chirurgie a ortopedie FN Ostrava

11:15 - 12:00

Brunch

BLOK II
12:00 - 14:00

Jak se osteotomie vrátily do ortopedie a kam až je možné jít?

Gallo J.

Ortopedická klinika LF UP a FN Olomouc

Změna přístupu k TEP, zejména kyčle

Matějka J.

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí FN Plzeň

Individuálně zhotovené kloubní náhrady v řešení rozsáhlých acetabulárních defektů revizní endoprotetiky

Novotný T.

Ortopedická klinika Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
a Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.

Změna přístupu k TEP kolena

Musil D.

Ortopedické oddělení Nemocnice České Budějovice

Vývoj alignmentu TEP kolena

Skála-Rosenbaum J.

Ortopedicko-traumatologická klinika 3. LF UK a FNKV

Využití vstřebatelných hořčíkových implantátů v terapii chondrálních defektů

Havlas V.

Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FNMH

Nové artroskopické rekonstrukční operace kolenního kloubu

Zeman P.

Klinika ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí FN Plzeň

MICA - inovativní technika na našem skromném pracovišti zavedena v poslední dekádě

Navrátil J.

Ortopedicko-traumatologické oddělení Vojenské nemocnice Brno

PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI

Ortopedické centrum s. r. o.
www.ortopedicke-centrum.cz
sekce REGISTRACE

REGISTRAČNÍ POPLATEK

Nutno se pouze zaregistrovat

MÍSTO KONÁNÍ

Aula ÚVN Praha-Střešovice,
U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6

ČASOVÝ ROZVRH

8.30 - 14.00 hod.



Flector® 50 mg

Diklofenak epolamin

Přináší úlevu od bolesti během okamžiku

Nástup účinku: **do 15 minut¹**

Léková forma: **granulát**

Účinek: **až 8 hodin¹**



Zkrácená informace o léčivém přípravku Flector 50 mg granule pro perorální roztok v sáčku

Léčivá látka a léková forma: Diclofenacum epolaminum 65 mg v jednom sáčku. Granule pro perorální roztok v sáčku. **Terapeutické indikace:** osteoartróza, mimikloubní revmatismus (periartritis, tendinitida, bursitida) a vřetogenní syndromy, poutřazové a poutřazové bolesti, bolest po zubalřských a ortopedických zákřadřích, bolest a zánřty ženských pohlavních orgánř a bolestivř menstruace, doplřkovř léčba při infekčních onemocněnřch, zvlřstř v oblasti uřř, nosu a krkř. **Dřkovnř a zpřsob podnř:** Obvyklř dřvka je 1 sřček dvřkrřtř až třkrřtř dennř. Casovř odstřp mezi dřvkami by mřl byt nejmnř 4 hodiny. Maximnř dennř dřvka je 200 mg diklofenaku. **Kontraindikace:** Hypersenzitivita na diklofenak nebo na kteroukoliv pomocnou lřtku uvedenou v bodě 6.1. Anamnezř plicetivřlosti na NSAID (astmatickř zřchvat, prudkř rřma, kořnř vyrřřky, kopřivka). Anamnestickř gastrointestinřlnř kvřcenř nebo perforace po NSAID. Aktivnř nebo anamnestickř rekurentnř peptickř vřed/hemoragie. Zvřřenř srdecnř selhřnř. Střvajicř mřstnřvř srdecnř selhřnř (NYHA II-IV), ischemickř choroba srdecnř, perifernř arteriřlnř onemocněnř a / nebo cerebrovaskulřrnř onemocněnř. Třtř trimestř gravidity. Těžkř renřlnř nebo hepatickř insuficience. **Zvlřstřnř upozornřnř a opatřenř pro pouřtř:** Neřadřdoutř účinky lze minimalizovat podřvřnřm nejmnřj účinnř dřvku po co nejkrřtř dobu nutnou k léčbě prřznřku. U starřlřch pacientř je zvřřenř vřřstřk neřadřdoutřch účinkř (viz bod 4.2). Prřdřvř lřkřřskř dohled musí byt zřstřřen u pacientř s poruchou funkce jater, srdecnřch nebo renřlnřch funkcř, hypertenzř, poruchami hemostazř, astmatem, sezonnř alergickř rřinitidou, zřdřenřm nosnř sliznice (např. nosnř polypy), chronickou obstrukcnř plicnř nemocř nebo chronickřmi respiracnřmi infekcemi (zvlřstř jsou-li spojeny s prřznaky podobnřmi alergickř rřinitidě), reakcemi na NSAID, Quinckeho eděmem nebo kopřivkou. Uřvřnř mřže maskovat prřznaky a projevy infekcnřch onemocněnř. Břhem léčby se nemřj přvřat alkoholickř nřpjoje. Tento léčivř preparace obsahuje 50 mg asparagmu, 1705 mg sorbitolu a 3,88 mg drřisku v jednom sřčku. **Interakce:** Diklofenak mřže: zvřřovat plazmatickř koncentrace lithia, digoxinu, methotrexatu, fenofibru; snřřit antihypertenznř účinek diuretik nebo antihypertenziv; zvřřit frekvenci vřřstřku gastrointestinřlnřch neřadřdoutřch účinkř kortikosteroidř nebo jinřch NSAID se systřmovřm účinkem; zvřřit riziko kvřcenř u antikoagulauci a antiagreganci; zvřřit riziko gastrointestinřlnřho kvřcenř u SSRI; prohloubit účinek antidiabetik; zvřřit nefrotoxicitu cyklosporinu. Colestipol a cholestyramin mohou indukovat opoždřnř nebo snřřeni absorpce diklofenaku. Silnř inhibitory CYP2C9 mohou zvřřovat maximřlnř plazmatickř koncentrace a expozici diklofenakem. Probenecid nebo sulfinpyrazon mohou zpomalit vylučovřnř diklofenaku. Existujř izolovanř hřřlenř o kředřch při soucasnřm podřvřnř s chronolovynř antibiotiky. **Fertilita, třřhotenřvř a kojenř:** Pokud to není jednozřdnř nevyhnutelnř, diklofenak se nemř podřvat břhem prvřho a druhřho trimestř gravidity. Kořdř matka mřže uřřvat diklofenak jen po poradě s lřkřkem. **Neřadřdoutř účinky:** Uvedeny jsou jen ty s casřm vřřstřkem. Bolest hlavy, zřvřnř, nřvřze, zřvřnř, prřjem, dyspepsie, epigastrickř bolest, plynatost, nechtřtenutř, svřřenř hodnoty aminotransferaz, vřřřka. **Zvlřstřnř opatřenř pro uchovřnř:** Uchovřjte při teplotě do 25 °C. **Druh obalu a velikost balenř:** Sřčky (papir/AI/PE), krabička, 20 sřčkř×50 mg. **Dřřitel rořhodnutř o registraci:** IBSA Slovakia s.r.o., Mřtna 42, 811 07 Bratislava, Slovenskř republika. **Registracnř řislo:** 29/514/99-C. **Datum revize textu:** 8. 8. 2025. Prřd předepsřnř preparaku se seznřme s opřrnřm zmnřnřm Souhřnř údajř o přpravku. Vřdej léčivřho přpravku je vřzřn na lřkřřskř přdps. Přpravek je řastřnř hřzen z prostředkř vřřejnřho zdravotnřho pořřstřnř.

Literatura: 1 Maggi, C.A. et al.: Comparative bioavailability of diclofenac hydroxyethylpyrrolidone vs diclofenac sodium in man. Eur J Clin Pharmacology. 1990

IBSBA PHARMA s.r.o., Senovřzřnř nřm. 1463/5, 110 00 Praha 1, www.ibsaczechia.cz

IBSA-FRAP-008-2026/8





Ortopedie „na míru“ začíná u fenotypu

Respektování fenotypu pacienta otevírá nové možnosti personalizace v náhradách kolenního kloubu.

- Koncept Pheno4U® a OrthoPilot® Elite
- VR aplikace pro trénink navigované operace
- ForPatientApplication® 2.0 a FPA® Move

Chcete se dozvědět více o konceptu Pheno4U® a navigaci OrthoPilot® Elite?

Obraťte se na svého obchodního zástupce B. Braun.

OrthoPilot® Elite a FPA® Move jsou registrované zdravotnické prostředky.

AESCULAP® je registrovaná obchodní značka Skupiny B. Braun.

B. Braun Medical s.r.o. | www.bbraun.cz

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

EXPANDING **PERSONALISED** KNEE CARE



Persona Primary Knee



Persona® Revision
Knee System



Persona Partial Knee

THE
Persona®
KNEE SYSTEM

Personalised Implants.
Precise Instrumentation.
Proven Technology.

 **ZIMMER BIOMET**



Scan this code to
learn more about the
Persona Knee System

All content herein is protected by copyright, trademarks and other intellectual property rights, as applicable, owned by or licensed to Zimmer Biomet or its affiliates unless otherwise indicated, and must not be redistributed, duplicated or disclosed, in whole or in part, without the express written consent of Zimmer Biomet. This material is intended for health care professionals. Distribution to any other recipient is prohibited. For indications, contraindications, warnings, precautions, potential adverse effects and patient counseling information, see the package insert or contact your local representative; visit www.zimmerbiomet.eu for additional product information. Check for country product clearances and reference product specific instructions for use. Not for distribution in France. ©2026 Zimmer Biomet


A0606.1-EMEA-en Issue Date 2026-03

Poznámky:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

When You Treat Sports Injuries...

*QuadLink™ ACLR with
FiberTag® TightRope®
SB Implants and the
InternalBrace™
Technique*



*SutureLoc™
Implant for
Meniscal Root
Repair*



*FiberStitch™ 1.5
All-Inside
Meniscal Repair
Implant*



*LET with Double Knotless
Knee FiberTak® Anchors*



*InternalBrace System
with DX Knotless
FiberTak Anchors*

*Knotless FiberTak
Biceps Anchor*



*FiberTak
SpeedBridge™ Repair*



*Knotless 1.8
FiberTak Soft
Anchor*



*Comprehensive
PRP Solutions*



*UCL Repair with
InternalBrace Technique*



*AutoCart™ Single-
Stage Cartilage
Restoration*



Nano Arthroscopy



Think Arthrex.

Arthrex®



1951

—•••—

2026

